


Helicobacter pylori: Programa colaborativo de detección oportunista en farmacia comunitaria para la prevención del cáncer gástrico


Paula Teixeira, ANF




IPO COIMBRA



Grupo Prevenção I
Stakeholders Group,
National Cancer Hub



Cáncer Gástrico



PORTUGAL

Incidencia: 3 668 (5°)


Mortalidad: 2 578 (3°)

Risco: Intermedio

Sin programas de prevención

All rights reserved. The designations employed and the presentation of the material in this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health Organization / International Agency for Research on Cancer concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. Dotted and dashed lines on maps represent approximate borderlines for which there may not yet be full agreement.


Cancer TODAY | IARC
<https://gco.iarc.who.int/today>
Data version: Globocan 2022 (version 1.1) - 08.02.2024
© All Rights Reserved 2025



Helicobacter pylori



Factor de riesgo
más relevante
para el cáncer
gástrico



Cancerígeno Tipo 1
(IARC - OMS)

La erradicación
reduce
significativamente
el riesgo de cáncer
gástrico



Alta
prevalencia
en Portugal



Programa de Rastreio

Oportunista de

Helicobacter pylori






Objetivos principais

- Implementar uma estratégia de pruebas y tratamiento en Portugal
- Probar un enfoque de proximidad a través de farmacias
- Promover la alfabetización sobre el cáncer y la detección del cáncer

Isla Terceira, Azores

- Zona geográfica restringida
- Más de 50.000 habitantes
- Alta incidencia de cáncer gástrico (19,6/100.000 hab.)



Parcerias locais



CENTRO DE ONCOLOGIA DOS AÇORES
PROF. DOUTOR JOSÉ CONDE




HOSPITAL DE SANTO ESPÍRITO
DA ILHA TERCEIRA, E.P.E.R.



COMMUNITY
PHARMACIES





Adherencia de
farmacias: 92%




Fase 1 | Detección de Hp

Fase 2 | Erradicación de Hp

Jornada de la persona




Participantes del estudio




n=1761

Sexo

Desconocido
0,1%



Educación




Dropout





n=126
(6.7% dropout)


Sexo




Educación




Resultados de la detección





n=1761



Resultados de la detección después de las pruebas de confirmación



n=1737
(1.4% dropout > n=24)






Resultados de la Fase 1




Resultados Hp+




n=111

Sexo




Educación




Resultados Hp por género



Feminino
(n=1076)




Masculino
(n=645)



(+) (-)

1.5x^{*}
más probabilidades de ser
Hp⁺
^{*}p=0.021

Ibrahim *et al.* (2017). Sex-differences in the prevalence of *Helicobacter pylori* infection in pediatric and adult populations: systematic review and meta-analysis of 244 studies. *Digestive and Liver Disease*, 49(7), 742-749.





Conclusiones y próximas etapas



Conclusiones

- La detección y el tratamiento tempranos de la infección por Hp son cruciales para la prevención de enfermedades oncológicas y la reducción de la mortalidad;
- El POHp muestra un enfoque innovador, colaborativo e interdisciplinario, involucrando a las farmacias comunitarias en los cribados oncológicos oportunistas, lo que resulta en una mayor adherencia de la población en comparación con otras estrategias;
- La proximidad y el contacto directo con la población parece contribuir a obtener mejores resultados de participación.

Pasos siguientes

- Publicar los resultados del estudio;
- Debido al éxito de esta iniciativa, a principios de agosto de 2025 se lanzó una nueva campaña de cribado en farmacias, para confirmar resultados negativos, de nuevo en farmacias, pero esta vez aplicando pruebas respiratorias.

